

## Protocolo COVID-19 para pacientes que ingreso a sala de Nefrología

**Alcance:** A todos los pacientes que ingresen a sala 3 o sala 5 durante pandemia COVID-19.

**Responsable:** este triage estará a cargo del equipo del médico responsable del ingreso.

**Procedimiento:** se les realizará triage de síntomas COVID-19 <sup>1</sup> y triage epidemiológico <sup>2</sup>, de forma telefónica o presencial previo al ingreso a sala.

| <sup>1</sup> Pilar Clínico (Triage de síntomas)                      | si | no |
|----------------------------------------------------------------------|----|----|
| Fiebre                                                               |    |    |
| Tos, expectoración                                                   |    |    |
| Disnea                                                               |    |    |
| Rinitis                                                              |    |    |
| Artromialgias                                                        |    |    |
| Odinofagia                                                           |    |    |
| Alteraciones gusto                                                   |    |    |
| Alteraciones de olfato                                               |    |    |
| Diarrea, vómitos o dolor abdominal ( sin otra causa que lo explique) |    |    |
| <sup>2</sup> Pilar Epidemiológico                                    | si | no |
| Antecedentes de contacto con paciente con COVID                      |    |    |
| Antecedentes de contacto con paciente con infección respiratoria     |    |    |

De acuerdo a esto, se definirá la conducta clasificando al paciente en los siguientes 2 escenarios

**1. Paciente con sospecha de COVID-19 (trriage de síntomas compatibles <sup>1</sup> y/o triage epidemiológico <sup>2</sup> positivo):**

- Seguirá el circuito de paciente sintomático respiratorio en Emergencia.
- Se solicitará test rt-PCR rápido para COVID-19:
  - Si el test rt-PCR rápido para COVID-19 es negativo (no detectable), seguirá el circuito habitual, con precauciones estándar.
  - Si el test rt-PCR rápido para COVID-19 es positivo (detectable), seguirá el circuito COVID-19 establecido.
  - Si no se cuenta con el resultado del test rt-PCR rápido para COVID-19, el paciente seguirá el circuito respiratorio hasta resultado.

**2. Paciente sin sospecha de COVID-19 (trriage de síntomas <sup>1</sup> y triage epidemiológico <sup>2</sup> negativo):**

- No requiere rt-PCR para COVID-19.
- Sigue circuito habitual con precauciones estándar.
- Requiere para atención uso de tapabocas quirúrgico y guantes.